

Dávkování Benoral (SÚKL 9999918)

Jednotlivá dávka při 3 dávkách/den			váha [kg]	Jednotlivá dávka při 4 dávkách/den		
min [ml]	až	max [ml]		min [ml]	až	max [ml]
1,33		2,67	5	1		2
2,67		5,33	10	2		4
4		8	15	3		6
5,33		10,67	20	4		8
6,67		13,33	25	5		10
8		16	30	6		12

3. Jak se přípravek Benoral užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: průměrně 750 000 IU má být podáno každých 8–12 hodin, což odpovídá 15 ml suspenze na jednu dávku.

Děti: 40 000-80 000 IU/kg/den rozdělených do 3 nebo 4 dávek. Obvyklá dávka je 50 000 IU/kg/den. V průměru se podává 0,25 ml suspenze na 1 kg tělesné hmotnosti.

Objem (ml) suspenze, který má být podán při jedné dávce, se odměřuje pomocí odměrné lžičky nebo, pokud je to vhodnější, u malých dětí pomocí injekční stříkačky, která je součástí balení. Suspenze se může užívat samostatně nebo se poté může naředit sklenicí vody. Před použitím lahvičku protřepejte.

V případě těžké poruchy funkce ledvin se má dávkování upravit podle hodnoty kreatininu nebo jeho clearance.

Podle PIL Benoral, dostupné z olikla.cz